

Institut royal des Sciences
naturelles de Belgique

BULLETIN

Tome XXXI, n° 46

Bruxelles, septembre 1955.

Koninklijk Belgisch Instituut
voor Natuurwetenschappen

MEDEDELINGEN

Deel XXXI, n° 46

Brussel, September 1955.

ROTATEURS DES MARES DE CHERTAL,

par André GILLARD (Gand).

INTRODUCTION.

Le présent travail est le résultat d'un examen de 26 échantillons de plancton et de périphyton provenant de trois petites mares (I, II, III) de Chertal. Le matériel que nous avons examiné a été fixé au moyen de formol de 3-4 %; par ce fait plusieurs formes étaient fortement contractées et indéterminables. De chaque échantillon nous avons examiné 8 à 12 préparations microscopiques quant à leur composition en rotateurs.

Il m'est un devoir très agréable de remercier sincèrement M. E. LELOUP, Directeur de Laboratoire, de la confiance qu'il a bien voulu me témoigner en mettant ce matériel à ma disposition pour examen rotiférologique. Les données écologiques m'ont été aimablement communiquées par M. L. VAN MEEL, assistant. Je le remercie cordialement de sa collaboration très estimée. Il est également de mon devoir d'exprimer ici ma sincère reconnaissance au Professeur J. VAN DEN BRANDE, Recteur de l'Institut Supérieur Agronomique de l'État à Gand, qui m'a accordé toutes les facilités de travail et dont le soutien moral ne m'a jamais manqué.

§ 1. Les mares de Chertal :

Les trois petites mares (I, II, III) de Chertal, dont nous avons étudié les rotateurs, sont situées à 2 km en aval du pont de Wandre. Elles ont fait l'objet d'un examen chimique

par L. VAN MEEL (1). D'après cet auteur ces eaux sont hexaïoniques et appartiennent au type limnologique des eaux eutrophes un peu mitigé cependant. Peu profondes, ces eaux ont une transparence moyenne et une couleur peu marquée. La faune benthique se compose de chironomides. La vase autochtone est riche en matière organiques. La teneur en O_2 est souvent déficiente, la teneur en Ca^{++} est moyenne. Le pH est plutôt alcalin, surtout dans la mare III où VAN MEEL a constaté une décalcification biogène.

L'analyse du phytoplancton a été confiée à M. H. KUFFERATH, collaborateur à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.

§ 2. Liste des échantillons examinés avec les données écologiques et les espèces trouvées :

C₁ : Mare I (17-III-52)

Température de l'eau : 9°C

pH : 7,4

Degré de saturation en O_2 : 76,46 %

Asplanchna sieboldi

Lepadella ovalis

Cephalodella sp.

Polyarthra vulgaris

Keratella ticinensis

Trichocerca (*Diurella*) sp.

Lepadella acuminata

Trichocerca (*Trichocerca*) sp.

C₂ : Mare II (17-III-52)

Température de l'eau : 11°C

pH : 7,3

Degré de saturation en O_2 : 64,65 %

Testudinella cœca

Testudinella pseudoclypeata

C₃ : Mare III (17-III-52)

Température de l'eau : 9°C

pH : 7,6

Degré de saturation en O_2 : 128,26 %

Notholca acuminata

C₄ : Mare I (1-IV-52)

Température de l'eau : 6°C

pH : 7,2

Degré de saturation en O_2 : 68,80 %

(1) E. LELOUP, L. VAN MEEL et S. JACQUEMART, 1954, Recherches hydro-biologiques sur trois mares d'eau douce des environs de Liège. Mém. Inst. roy. Sc. nat. Belg., n° 131, 145 p., 21 fig., 4 pl. hors-texte.

Bdelloïdes

*Lepadella patella**Dissotrocha* sp.C₅ : Mare I (1-IV-52)Données écologiques : cfr. C₄*Ascomorpha ecaudis**Lophocharis salpina**Asplanchna* sp.*Monommata* sp.*Cephalodella* sp.*Mytilina mucronata**Colurella obtusa**Polyarthra longiremis**Keratella quadrata**Polyarthra dolichoptera**Keratella testudo**Polyarthra vulgaris**Keratella ticinensis**Squatinella rostrum**Lecane (Monostyla) bulla**Synchæta* sp.*Lecane (Monostyla) sp.**Testudinella emarginula**Lecane flexilis**Testudinella patina**Lepadella acuminata**Trichocerca (Trichocerca) sp.**Lepadella patella**Trichotria pocillum*C₆ : Mare II (1-IV-52)

Température de l'eau : 6°C

pH : 7,4

Degré de saturation en O₂ : 72,74 %*Lepadella patella**Testudinella mucronata*C₇ : Mare III (1-IV-52)

Température de l'eau : 6°C

pH : 7,6

Degré de saturation en O₂ : 93,77*Notholca acuminata**Testudinella emarginula**Polyarthra* sp.*Trichocerca* sp.C₈ : Mare III (1-IV-52)Données écologiques : cfr. C₇*Notholca acuminata*C₉ : Mare I (15-IV-52)

Température de l'eau : 13°C

pH : 7,4

Degré de saturation en O₂ : 33,58 %

Rotateurs absents

C₁₀ : Mare II (15-IV-52)

Température de l'eau : 11°1

pH : 7,3

Degré de saturation en O₂ : 49,01 %

Bdelloïdes

C₁₁ : Mare I (28-IV-52)

Température de l'eau : 13°C

pH : 7,4

Degré de saturation en O₂ : 101,57 %*Colurella deflexa**Mytilina mucronata**Lepadella patella**Polyarthra dolichoptera**Lepadella* sp.*Testudinella patina* ssp.C₁₂ : Mare II (28-IV-52)

Température de l'eau : 13°C

pH : 7,2

Degré de saturation en O₂ : 52,27 %*Testudinella patina* ssp.C₁₃ : Mare III (28-IV-52)

Température de l'eau : 13°C

pH : 7,6

Degré de saturation en O₂ : 135,19 %*Keratella quadrata* (groupe « dispersa »)*Trichocerca* sp.C₁₄ : Mare I (28-V-52)

Température de l'eau : 10°C

pH : 7,0

Degré de saturation en O₂ : 25,46 %*Polyarthra* sp.*Trichocerca* (*Trichocerca*) sp.*Squatinella rostrum*C₁₅ : Mare I (28-V-52)Données écologiques : cfr. C₁₄*Lepadella acuminata**Squatinella rostrum**Lepadella* sp.*Testudinella patina* ssp.*Mytilina mucronata**Trichocerca* sp.C₁₆ : Mare II (28-V-52)

Température de l'eau : 9°C

pH : 7,3

Degré de saturation en O₂ : 84,50 %*Lepadella* sp.

C₁₇ : Mare III (28-V-52)

Température de l'eau : 9°C

pH : 7,6

Degré de saturation en O₂ : 123,56 %*Lepadella acuminata* *Testudinella patina* ssp.*Mytilina mucronata*C₁₈ : Mare I (30-VI-52)

Température de l'eau : 28°C

pH : 7,2

Degré de saturation en O₂ : 175,83 %*Colurella* sp. *Testudinella patina**Lecane (Monostyla)* sp. *Testudinella truncata**Mytilina mucronata* *Trichocerca (Diurella)* sp.C₁₉ : Mare II (30-VI-52)

Température de l'eau : 23°C

pH : 7,4

Degré de saturation en O₂ : 156,99 %*Cephalodella* sp. *Testudinella patina**Lepadella triptera* *Trichocerca (Diurella) tigris* ?*Mytilina mucronata* *Trichotria pocillum*C₂₀ : Mare III (30-VI-52)

Température de l'eau : 28°C

pH : 7,2

Degré de saturation en O₂ : 15,9 %*Euchlanis* sp. *Lepadella patella**Lecane* sp.C₂₁ : Mare I (28-VII-52)

Température de l'eau : 20°C

pH : 7,2

Degré de saturation en O₂ : 41,97 %*Colurella* sp. *Lecane flexilis**Euchlanis* sp. *Lecane luna**Lecane (Monostyla) bulla* *Lepadella acuminata**Lecane (Monostyla) cfr. crypta* *Trichocerca (Diurella)* sp.*Lecane (Monostyla) sp.*C₂₂ : Mare I (28-VII-52) : PériphytonDonnées écologiques : cfr. C₂₁*Bdelloïdes* *Lecane (Monostyla) closterocerca**Diglena* sp. *Ptygura* sp.*Dissotrocha* sp.

C₂₃ : Mare III (28-VII-52)

Température de l'eau : 20°C

pH : 7,2

Degré de saturation en O₂ : 34,01 %

Testudinella patina ssp.

C₂₄ : Mare III (28-VII-52) : Périphyton

Données écologiques : cfr. C₂₃

Bdelloïdes

Lecane (Monostyla) sp.

Lecane (Lecane) sp.

Lepadella ovalis

C₂₅ : Mare II (5-VIII-52)

Température de l'eau : 19°C

pH : 7,2

Degré de saturation en O₂ : 39,36 %

Bdelloïdes

Lepadella sp.

Colurella uncinata

Mytilina mucronata

Lecane (Monostyla) *bulla*

Testudinella patina

Lecane (Monostyla) sp.

Trichocerca (Diurella) sp.

Lecane luna

Trichocerca longiseta

Lepadella ovalis

C₂₆ : Mare II (5-VIII-52) : Algues filamenteuses

(*Spirogyra*)

Données écologiques : cfr. C₂₅

Bdelloïdes

Testudinella patina

§ 3. Remarques sur les espèces trouvées :

Genre *Ascomorpha* PERTY, 1850.

Ascomorpha ecaudis PERTY, 1850.

Échantillon : C₅.

Mare : I.

DONNER (1943) donne une très bonne description (avec figure) de cette espèce qui est assez commune en Europe. Ce rotateur fut signalé pour la Sibérie par LANG (1934). C'est la troisième fois que cette espèce a été trouvée en Belgique.

Genre *Asplanchna* GOSSE, 1850.

Asplanchna sieboldii (LEYDIG, 1854).

Échantillon : C₁.

Mare : I.

Cette espèce fut signalée en Belgique pour la première fois par LOPPENS à Nieuport (1908).

Asplanchna sp.

Échantillon : C₅.

Mare : I.

Les exemplaires étaient tellement contractés, qu'il nous fut impossible de les déterminer jusqu'à l'espèce.

Bdelloides.

Échantillons : C₄, C₁₀, C₂₂, C₂₄, C₂₅, C₂₆.

Mares : I, II, III.

La grande majorité des espèces de ce groupe est indéterminable lorsque les spécimens sont contractés. BARTOŠ en 1951 a publié un remarquable travail sur les *Bdelloïdes* de la Tchécoslovaquie qui constitue une contribution unique sur ce groupe excessivement intéressant et peu étudié en Belgique.

Genre *Cephalodella* BORY DE ST VINCENT, 1826.

Cephalodella sp.

Echantillons : C₁, C₅, C₁₉.

Mares : I, II.

Genre *Colurella* BORY DE ST VINCENT, 1822.

Colurella deflexa (EHRENBERG, 1838).

Echantillon : C₁₁.

Mare : I.

Espèce nouvelle pour la faune belge. CARLIN (1939, p. 14) la considère comme étant une « variété » de *Colurella bicuspidata* (EHRENBERG).

Colurella obtusa GOSSE, 1886.

Échantillon : C₅.

Mare : I.

Longueur de la carapace : 71 μ .

Largeur de la carapace : 39 μ .

Hauteur de la carapace : 47 μ .

Longueur du pied (orteil y compris) : 37 μ .

Longueur des orteils : 19 μ .

Cette espèce est signalée pour la première fois en Belgique. WULFERT (1942) a trouvé cette espèce dans une mare salée (Italie). Elle paraît être eurytherme et euryhaline. Elle fut déjà signalée e.a. pour l'Australie (BERZINŠ 1953), le Mexique (CARLIN 1935), l'Islande (BARTOŠ 1951), l'Allemagne (WULFERT 1942), l'Autriche (DONNER 1943), l'Italie (WULFERT 1942) et la Suède (CARLIN 1939, BERZINŠ 1950).

Colurella sp.

Echantillons : C₁₈, C₂₁.

Mare : I.

Genre *Diglena* (EHRENBERG, 1830).

Diglena sp.

Echantillon : C₂₂.

Mare : I.

Les exemplaires fortement contractés par le formol, étaient indéterminables jusqu'à l'espèce.

Genre *Dissotrocha* BRYCE, 1910.

Dissotrocha sp.

Echantillons : C₄, C₂₂.

Mare : I.

Espèce indéterminable vu la contraction des spécimens.

Genre *Euchlanis* EHRENBERG, 1830.

Euchlanis sp.

Echantillons : C₂₀, C₂₁.

Mares : I, III.

Longueur totale : 230 μ .

Longueur de la carapace : 190 μ .

Largeur de la carapace : 125 μ .

Genre *Keratella* BORY DE ST VINCENT, 1827.

Keratella quadrata (O. F. MÜLLER, 1786).

Echantillons : C₅, C₁₃.

Mares : I, III.

Les formes de l'échantillon C₁₃ correspondent complètement avec celles classées par CARLIN (1943) sous le groupe « *dispersa* ».

Longueur totale de la carapace : 283 μ .

Largeur de la carapace : 120 μ .

Longueur des épines postérieures : 97 μ .

Keratella quadrata est une espèce cosmopolite, euryionique et eurytherme. C'est une des espèces les plus communes en Belgique.

Keratella testudo (EHRENBERG, 1832).

Synonymie : *Keratella quadrata brevispina* (EHRENBERG).

Échantillon : C₅.

Mare : I.

Longueur totale de la carapace : 152 μ .

Largeur de la carapace : 89 μ .

Longueur des épines postérieures : 15 μ .

Œufs : 60 μ \times 76 μ .

Espèce qui n'a été trouvée qu'une seule fois auparavant en Belgique avec certitude, notamment à Bellem (GILLARD 1948). Elle fut notée e.a. pour la Tchécoslovaquie (BARTOŠ 1946), la Pologne (PAWŁOWSKI 1938) et l'Espagne (SELGA 1952).

Keratella ticinensis (CALLERIO, 1920).

Synonymie : *Anuræa aculeata* var. *ticinensis* CALLERIO.

Keratella quadrata var. *curvicornis* (EHRENBERG).

Echantillons : C₁, C₅.

Mare : I.

	LUCKS (1912)	AHLSTROM (1943)	HAUER (1952)	Chertal
Longueur totale de la carapace ...	120 μ	140 μ	144 μ	128-145 μ
Plus grande longueur de la carapace	68 μ	73 μ	72 μ	62-79 μ

Espèce trouvée jusqu'à présent uniquement en Europe. Elle est nouvelle pour la faune de notre pays.

Nous avons trouvé ce rotateur en assez grand nombre dans les échantillons C₁ et C₅ de la mare I. Le « pattern » de toutes les espèces étudiées était très indistinct. M. J. HAUER (KARLSRUHE) a bien voulu confirmer notre détermination. Je le remercie sincèrement de sa bienveillante collaboration.

HAUER (1952) donne de très bons dessins de cette espèce qui fut déjà signalée e.a. pour l'Italie du Nord (CALLERIO 1920), la Suède (CARLIN 1943), la Tchécoslovaquie (BARTOŠ 1946) et l'Allemagne (HAUER 1952). C'est une espèce plutôt rare.

Genre *Lecane* NITZSCH, 1827.

Lecane flexilis (GOSSE, 1886).

Echantillons : C₅, C₂₁.

Mare : I.

Longueur de la carapace : 83 μ .

Largeur de la carapace : 70 μ .

Longueur des orteils : 24 μ .

Lecane luna (O. F. MÜLLER, 1776).

Echantillons : C₂₁, C₂₅.

Mares : I, II.

Longueur de la carapace : 145 μ .

Largeur de la carapace : 115 μ .

Espèce commune en Belgique.

Lecane (*Lecane*) sp.

Echantillons : C₂₀, C₂₄.

Mare : III.

La détermination de plusieurs espèces de ce genre est impossible lorsque les spécimens sont contractés. La taxonomie de ce genre est très confuse; une revision complète s'impose.

Lecane (*Monostyla*) *bulli* GOSSE, 1851.

Echantillons : C₅, C₂₁, C₂₅.

Mares : I, II.

Espèce très commune en Belgique. Elle est euryhaline, euryionique et cosmopolite (e.a. Australie (BERZINŠ 1953), Iles Chatham (RUSSELL 1953), Nouvelle Zélande (RUSSELL 1945), Java (HAUER 1937-38), Congo Belge (GILLARD 1952), Italie (WULFERT 1942), Tchécoslovaquie (SLÁDEČEK 1951), Autriche (DONNER 1943).

Lecane (Monostyla) closterocerca (SCHMARDT), 1853.Echantillon : C₂₂.

Mare : I.

Longueur de la carapace : 74 μ .Largeur de la carapace : 73 μ .

Espèce nouvelle pour la Belgique. Elle est cosmopolite, eurytope et euryhaline. PAWLOWSKI (1938) l'a trouvée dans des mousses. PAX & WULFERT (1942) l'ont signalée pour des acratothermes et des sources sulfureuses.

Lecane (Monostyla) cfr. crypta HAUER, 1938.Echantillon : C₂₁.

Mare : I.

Longueur de la carapace : 53 μ .

L'unique spécimen que nous avons observé était relativement fort contracté, de sorte que la détermination était très difficile et douteuse. La forme que nous avons examinée correspondait assez bien à *Lecane (Monostyla) crypta*.

*Lecane (Monostyla) spp.*Echantillons : C₅, C₁₆, C₂₁, C₂₄, C₂₅.

Mares : I, II, III.

Dans les échantillons précités nous avons trouvé plusieurs espèces de *Lecane (Monostyla)*. Par le fait qu'elles étaient contractées, une détermination exacte était impossible. Une revision sur ce genre s'impose.

Genre *Lepadella* BORY DE ST VINCENT, 1822.*Lepadella acuminata* (EHRENBERG, 1834).Echantillons : C₁, C₅, C₁₅, C₁₇, C₂₁.

Mares : I, III.

Longueur de la carapace : 118 μ .Largeur de la carapace : 68 μ .Longueur des orteils : 29 μ .*Lepadella ovalis* (O. F. MÜLLER, 1786).Echantillons C₁, C₂₄, C₂₅.

Mares : I, II, III.

Espèce commune en Belgique.

Lepadella patella (O. F. MÜLLER, 1786).

Echantillons : C₄, C₅, C₆, C₁₁, C₂₀.

Mares : I, II, III.

Longueur de la carapace : 120-157 μ .

Largeur de la carapace : 87-148 μ .

Espèce euryhaline qui a été trouvée dans des acratothermes (PAX & WULFERT 1942). PAWLOWSKI (1938) l'a trouvée dans des mousses.

Lepadella sp.

Echantillons : C₁₁, C₁₅, C₁₆, C₂₅.

Mares : I, II.

Dans les échantillons précités nous avons trouvé une espèce indéterminable du genre *Lepadella*.

Lepadella triptera EHRENBERG, 1832.

(Fig. 1.)

Echantillon : C₁₉.

Mare : II.

Mensurations :

	MARGALEF (1948)	Chertal
Longueur de la carapace	55-65 μ	70 μ
Largeur de la carapace	40-56 μ	54 μ
Longueur des orteils	15 μ	17 μ

La forme que nous avons trouvée ressemble complètement à la figure 7 c de CARLIN (1939). Espèce rare en Belgique, signalée par VAN OYE (1953) pour Genk et Gand.

Ce rotateur a déjà été trouvé e.a. en Islande (BARTOS 1951), Suède (CARLIN 1939), Autriche (DONNER 1943), Espagne (MARGALEF 1948 - SELGA 1952), Tchécoslovaquie (SLÁDEČEK 1950, 1951), Mexique (CARLIN 1935), Nouvelle Zélande (RUSSELL 1945). PAX & WULFERT (1941) l'ont trouvée dans des thermes.

Genre *Lophocharis* EHRENBURG, 1838.*Lophocharis salpina* EHRENBURG, 1851.

Synonymie : *Lepadella salpina* EHRENBURG, VAN OYE 1953.

Échantillon : C₅.

Mare : I.

Longueur de la carapace : 160 μ .

Espèce relativement rare en Belgique.

Une bonne figure de ce rotateur est donnée par KONIAR (1950, p. 120, Tab. V, fig. 1-4).




Fig. 1. — *Lepadella triptera* EHRENBURG, 1832, ($\times 740$). Mare II.

Fig. 2. — *Notholca acuminata* (EHRENBURG, 1832), ($\times 370$). Mare III.

Genre *Monommata* BARTSCH, 1870.*Monommata* sp.Échantillon : C₅.

Mare : I.

Un seul spécimen a été observé.

Genre *Mytilina* BORY DE ST VINCENT, 1824.*Mytilina mucronata* (O. F. MÜLLER, 1773).Échantillons : C₅, C₁₁, C₁₅, C₁₇, C₁₈, C₁₉, C₂₅.

Mares : I, II, III.

Jusqu'à présent cette espèce n'est connue que de 4 stations. La détermination des espèces de ce genre n'est pas toujours chose facile, surtout par le fait que la systématique de ce genre est confuse et mérite une révision complète.

Genre *Notholca* GOSSE, 1886.*Notholca acuminata* (EHRENBERG, 1832).

(Fig. 2.)

Échantillons : C₃, C₇, C₈.

Mare : III.

Longueur totale de la carapace : 315 μ .Largeur de la carapace : 120 μ .

Espèce commune en Belgique.

Genre *Polyarthra* EHRENBERG, 1834.*Polyarthra dolichoptera* (IDELSON, 1925).Échantillons : C₅, C₁₁.

Mare : I.

Espèce signalée e.a. pour la Suède (CARLIN 1943), la Tchécoslovaquie (BARTOŠ 1951 B) et la Suisse (NIPKOW 1952). Ce rotateur est probablement plus répandu que ces données ne pourraient le faire croire. En effet, avant la révision par CARLIN (1943), cette espèce a été généralement appelée *P. platyptera* ou *P. trigla* qui ne constituent que des noms collectifs pour plusieurs espèces bien distinctes. NIPKOW (1952), qui a entrepris une étude très intéressante sur la biologie et la systématique

de plusieurs espèces du genre *Polyarthra*, a publié une belle série de photos représentant des œufs, un mâle, une femelle mictique et une femelle amictique, ainsi qu'une forme aptère (planche I, p. 138).

Polyarthra longiremis CARLIN, 1943.

Échantillon : C₅.

Mare : I.

Polyarthra vulgaris CARLIN, 1943.

Echantillons : C₁, C₅.

Mare : I.

Espèce déjà signalée e.a. pour la Suède (CARLIN 1943, BERZINŠ 1950), l'Islande (BARTOŠ 1951 A) et la Tchécoslovaquie (BARTOŠ 1951 B). Elle est commune en Belgique.

Polyarthra sp.

Echantillons : C₇, C₁₄.

Mares : I, III.

Genre *Ptygura* EHRENBURG, 1832.

Ptygura sp.

Echantillon : C₂₂.

Mare : I.

Les spécimens contractés furent indéterminables.

Genre *Squatinella* BORY DE ST VINCENT, 1826.

Squatinella rostrum SCHMARDA, 1846.

Synonymie : *Squatinella lamellaris* (O. F. MÜLLER, 1786) — VAN OYE 1953 (1952), p. 296.

Echantillons : C₅, C₁₅.

Mare : I.

Longueur de la carapace : 137 μ .

Largeur de la carapace : 58 μ .

En ce qui concerne la nomenclature de cette espèce, nous renvoyons le lecteur à notre note parue en 1952 (p. 344).

Genre *Synchaeta* EHRENBURG, 1832.*Synchaeta* sp.Echantillon : C₅.

Mare : I.

Genre *Testudinella* BORY DE ST VINCENT, 1827.*Testudinella cœca* PARSONS, 1898.Echantillon : C₂.

Mare : II.

Longueur de la carapace : 174-183 μ .Largeur de la carapace : 117-125 μ .

Espèce nouvelle pour la faune belge.

Testudinella emarginula (STENROOS, 1898).Echantillons : C₅, C₇.

Mares : I, III.

Espèce relativement commune en Belgique.

Testudinella mucronata (GOSSE, 1886).Echantillon : C₆.

Mare : II.

Longueur de la carapace : 186 μ .Largeur de la carapace : 152 μ .

Trouvée jusqu'à présent en Belgique dans des eaux alcalines (pH : 7,4-8,7). Elle semble assez généralement répandue en Belgique.

Testudinella patina (HERMANN, 1783).

(Fig. 3.)

Echantillons : C₅, C₁₈, C₁₉, C₂₅, C₂₆.

Mares : I, II.

Espèce cosmopolite, euryionique et très variable.

Nous avons trouvé des formes « normales » et des formes « géantes ».

Longueur de la carapace :

1) formes normales :

160-200 μ (CARLIN 1943)

176-184 μ (WULFERT 1939)
180-200 μ (GILLARD 1952)
180-220 μ (MARGALEF 1947)
152-218 μ (propres mensurations : Chertal).

2) formes géantes :

230-266 μ (CARLIN 1943)
240-252 μ (WULFERT 1939)
283 μ (GILLARD 1952)
260-294 μ propres mensurations : Chertal).



Fig. 3. — *Testudinella patina* (HERMANN, 1783), ($\times 370$). Mare I.

Jusqu'à présent des formes géantes n'étaient connues que du Mexique (CARLIN 1935), de l'Allemagne (WULFERT 1939), de la Suède (CARLIN 1943), de Bohême (CARLIN 1943) et du Congo Belge (GILLARD 1952). Les formes géantes trouvées par CARLIN et WULFERT possèdent un orifice pédocloacal qui est situé plus près du centre que chez la forme normale. Dans notre étude sur les rotateurs du Katanga (GILLARD 1952) nous avons fait remarquer que la position plus centrale de cet orifice ne paraît nullement caractéristique pour les formes géantes puisque nous avons trouvé une forme géante dont la position de l'orifice était « normale » et une forme normale dont la position de l'orifice était analogue à celle des formes géantes. Dans ce matériel de Chertal la position de l'orifice pédocloacal était plus centrale que chez les formes normales.

Les chiffres suivants donnent (en % de la longueur totale de la carapace) la distance du centre de l'orifice pédocloacal au bord postérieur de la carapace :

1) formes normales :

CARLIN : 31,5 %

WULFERT : 30 %

GILLARD : 30 % et 37,5 %

Matériel de Chertal : 30 % et 32,8 %

2) formes géantes :

CARLIN : 43 %

WULFERT : 41 %

GILLARD : 28 %

Matériel de Chertal : 40,8 %, 41,8 % et 38,4 %.

Testudinella patina ssp.

(Fig. 4.)

Echantillons : C₁₁, C₁₂, C₁₅, C₁₇, C₂₃.

Mares : I, II, III.

Dans les échantillons précités nous avons trouvé des formes de *Testudinella patina* se distinguant des formes normales par un coefficient $\alpha = \frac{\text{longueur de la carapace}}{\text{largeur de la carapace}}$ plus élevé et par un orifice pédocloacal plus grand.

Longueur de la carapace : 153-257 μ (moyenne de 8 individus = 221 μ).

Largeur de la carapace : 126-192 μ (moyenne de 8 individus = 176 μ).

Longueur de la carapace
 ————— = α = 1,21-1,33 (moyenne de
 Largeur de la carapace
 8 individus = 1,26 μ).

Largeur de la carapace
 ————— = β = 4,4-6,3 (moyenne
 Largeur de l'orifice pédocloacal
 de 10 individus = 4,9 μ).

Coefficient α des formes normales que nous avons trouvées = 1,02-1,18 (moyenne de 10 individus = 1,10).

Coefficient β des formes normales = 6,25-12,8 (moyenne de 10 individus = 8,26).

Il est très probable que cette forme allongée de *Testudinella patina* représente une race distincte.




Fig. 4, a-b. — *Testudinella patina* ssp. ($\times 370$). Mare I.

Testudinella pseudoclypeata BÉRZINS, 1943.Echantillon : C₂.

Mare : II.

Longueur de la carapace : 218 μ .Largeur de la carapace : 120 μ .

Cette espèce, qui est nouvelle pour la faune belge, n'était connue jusqu'à présent que de la Lettonie (BERZINŠ 1943).

Testudinella truncata (GOSSE, 1886).Echantillon : C₁₈.

Mare : I.

Longueur de la carapace : 143 μ .Largeur de la carapace : 86 μ .Genre *Trichocerca* LAMARCK, 1801.*Trichocerca longiseta* (SCHRANK, 1793).Echantillon : C₂₅.

Mare : II.

Trichocerca (*Trichocerca*) sp.Echantillons : C₁, C₅, C₇, C₁₃, C₁₄, C₁₅.

Mares : I, III.

Trichocerca (*Diurella*) sp.Echantillons : C₁, C₁₈, C₂₁, C₂₅.

Mares : I, II.

Trichocerca (*Diurella*) *tigris* (O. F. MÜLLER, 1786).Echantillon : C₁₉.

Mare : II.

Genre *Trichotria* BORY DE ST VINCENT, 1827.*Trichotria pocillum* (O. F. MÜLLER, 1776).Echantillons : C₅, C₁₉.

Mares : I, II.

Longueur des orteils : 96 μ .Longueur de l'épine située entre les deux orteils : 18 μ .

INDEX BIBLIOGRAPHIQUE.

- AHLSTROM, E. H., 1943, *A Revision of the Rotatorian Genus Keratella with Descriptions of Three New Species and Five New Varieties*. (Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., LXXX, Art. XII, pp. 411-457.)
- BARTOŠ, E., 1946, *české druhy rodu Keratella (Virnici) a Klic k jejich urcování*. (čas. Nár. mus. přír., 115, pp. 21-37.)
- , 1951 A, *Rotatoria of the Czechoslovakian Iceland-expedition*. (Hydrobiologia, III (3), pp. 244-250.)
- , 1951 B, *československé druhy rodu Testudinella a Pompholyx. (Rot.)*. (Sbornik Klubu Přírodovědeckého V Brne, XXIX, pp. 10-20.)
- , 1951 C, *The Czechoslovak Rotatoria of the Order Bdelloidea*. (Vestník Čs. zoologické společnosti, XV (2, 3, 4), 243-500.)
- BERZINŠ, B., 1943, *Systematisch-faunistisches Material über Rotatorien Lettlands*. (Folia zoologica et hydrobiologica, vol. XII (1), Riga, pp. 218-244, 29 fig.)
- , 1950, *Om Rotatoriefaanen i Dammarna vid Fiskeriförsöksstationen i Aneboda*. (Skrifter utgivna av Södra Sveriges Fiskeriförening, pp. 102-123.)
- , 1953, *Zur Kenntnis der Rotatorien aus West-Australien*. (Lunds Univ. Årsskrift, N. F. Avd. 2, Bd. 49, n° 8. Kungl. Fysiogr. Sällsk. Handl. N. F. Bd 64, n° 8, pp. 1-12.)
- CALLERIO, M. P., 1920, *Rotiferi delle acque pavesi*. (Atti Soc. Ital. Sci. Nat., CIX, Milano.) (fide CARLIN 1943).
- CARLIN, B., 1935, *Rotatorien aus Mexico*. (Kungl. Fysiogr. Sällsk. i Lund Förhandl., Bd 5 (n° 18), pp. 175-185.)
- , 1939, *Über die Rotatorien einiger Seen bei Aneboda*. (Meddel. fr. Lunds Universitets Limnologiska Institution. n° 2, pp. 1-68.)
- , 1943, *Die Planktonrotatorien des Motalaström. Zur Taxonomie und Ökologie der Planktonrotatorien*. (Medd. fr. Lunds Univ. Limnol. Inst., n° 5, 256 pp., 4 pl.)
- DONNER, J., 1943, *Zur Rotatorienfauna Südmährens. Mit Beschreibung der neuen Gattung Wulfertia*. (Zool. Anz., 143 (1/2), pp. 21-33.)
- GILLARD, A., 1948, *De Brachionidæ (Rotatoria) van België met Beschouwingen over de Taxonomie van de Familie*. (Natuurwet. Tijdschr., 30, pp. 159-218, pl. II-IV.)
- , 1951, *Kataloog der Raderdieren van België*. (Natuurwet. Tijdschr., 32 (1950), pp. 175-206.)
- , 1952, *Raderdieren van Katanga*. (Mededel. Landbouwhogeschool en Opzoekingsstat. v.d. Staat te Gent, XVII (2), pp. 333-352.)
- HAUER, J., 1937-38, *Die Rotatorien von Sumatra, Java und Bali nach den Ergebnissen der Deutschen Limnologischen Sunda-Expedition*. (Arch. f. Hydrobiol. Suppl. Bd. XV (Trop. Binnengewässer VII) Heft 2-3, pp. 296-384, pp. 507-602.)
- , 1952, *Pelagische Rotatorien aus dem Windgfallweiher, Schluchsee und Titisee im südlichen Schwarzwald*. (Arch. f. Hydrobiol., Suppl. XX. Schriften d. Hydrobiol. Stat. f.d. Schwarzwald, Falkau, I, pp. 212-237.)
- KONIAR, P., 1950, *Virniky (Rotatoria) Slovenska*. (Přírodovedny sborník S. A. U. V., V, Bratislava, pp. 88-131.)
- LANG, K., 1934, *Rotatorien aus Siberien*. (Kungl. Fysiogr. Sällsk. i Lund Förhandl., V (n° 8), pp. 82-86.)

- LOPPENS, K., 1908, *Contribution à l'étude du micro-plankton des eaux saumâtres de la Belgique*. (Ann. Biol. lac., III, 16-53.)
- LUCKS, R., 1912, *Zur Rotatorienfauna West-preussens*. (Danzig, pp. 1-207.)
- MARGALEF, R., 1948, *Notas sobre algunos Rotíferos*. (Publ. del Institut. de Biol. Aplicado, IV (1947), pp. 136-148.)
- NIPKOW, F., 1952, *Die Gattung Polyarthra EHRENBERG im Plankton des Zürichsees und einiger anderer Schweizer Seen*. (Schweiz. Zeitschr. f. Hydrobiologie, XIV (1), 135-181.)
- PAWLOSKI, L. K., 1938, *Materialien zur Kenntnis der moosbewohnenden Rotatorien Polens*. (Ann. Mus. Zool. Polonici, XIII (12), 115-159.)
- PAX, F. & WULFERT, K., 1941, *Die Rotatorien deutscher Schwefelquellen und Thermen*. (Arch. f. Hydrobiol., XXXVIII, pp. 165-213.)
- , 1942, *Die Rädertiere der deutschen Thermen*. (Lotos, LXXXVIII (1941/1942), 246-262.)
- OYE, VAN P., 1953, *Recherches sur les Rotateurs de Belgique. VII. Nouvelles données et conclusions biologiques*. (Ann. Soc. Roy. Zool. Belg., 1952, LXXXVIII (2), 269-328.)
- RUSSELL, C. R., 1945, *A Reference List of the Rotatoria of New Zealand, with Ecological Notes*. (Trans. Roy. Soc. of New Zealand, 75 (2), pp. 102-123.)
- , 1953, *Additions to the Rotatoria of New Zealand. Part V*. (Trans. Roy. Soc. New Zealand, 81 (1), pp. 73-78.)
- SELGA, D., 1952, *Contribución al conocimiento de los Rotíferos de España. 1. Rotíferos de las aguas continentales españolas y su distribución*. (Publ. del Institut. de Biol. Aplicada, XI, pp. 113-123.)
- SLADEČEK, V., 1950, *A limnological study of the Ponds of Padrt' (Bohemia)*. (Bull. internat. Acad. tchèque des Sciences, LI (21), pp. 1-22.)
- , 1951, *Studie o zooplanktonu Padrt'ských rybníků a o perloocce Holopedium gibberum*. (Rozpravy II. Tridy české Akademie, LX (22), pp. 1-50.)
- WULFERT, K., 1939, *Beiträge zur Kenntnis der Rädertierfauna Deutschlands. Teil IV*. (Archiv. f. Hydrobiol., XXXV, pp. 563-624.)
- , 1942, *Über die Meeres- und Brackwasserrotatorien in der Umgebung von Rovigno d'Istria*. (Thalassia, IV, (7), pp. 1-26, pl. I-VI.)

INSTITUT SUPÉRIEUR AGRONOMIQUE DE L'ÉTAT A GAND.
LABORATOIRE DE ZOOLOGIE.

